

BLATTE AMÉRICAINNE

(Periplaneta americana)

DENOMINATION	Blatte américaine ou Cancrelat.
CARACTERISTIQUES	Long : de 30 à 40mm. Couleur du roux ferrugineux à marron. Une bande jaunâtre sur le bord du thorax. Ailes plus longues que le corps.
HABITUDES, HABITAT	-Recoins sombres, chauds et très humides : animaleries, égouts, gaines de vide-ordures. -Recherche la chaleur humide avec des résidus moisiss. -Active dans les endroits sombres.
DURÉE DE VIE DE L'ADULTE	De 6 à 10 mois.
RÉGIME ALIMENTAIRE DE L'ADULTE	Se nourrit de toute matière organique avec une préférence pour les produits moisiss y compris les crottes des autres animaux.
FÉCONDITÉ	De 7 à 12 oothèques/femelle – de 20 à 28 œufs/oothèques.
DÉVELOPPEMENT LARVAIRE	Environ 10 mois.
RÉGIME ALIMENTAIRE DES LARVES	Même nourriture que les adultes.
CYCLE DE DÉVELOPPEMENT	De 10 à 12 mois.
DÉGÂTS SUR MATÉRIELS	-Grignote les emballages minces en papier ou en plastique. -Tâches sur emballages avec les déjections.
RISQUES SANTÉ ANIMALE ET HUMAINE	Vecteur de moisissures, de bactéries, de virus et de certains vers intestinaux responsables de certaines maladies.