

## PUCES

*(Ctenocephalides-pulex-xenopsylla)*

<b>DENOMINATION</b>	<p>Puce du chat : <i>Ctenocephalides felis</i>  Puce du chien : <i>Ctenocephalies canis</i>  Puce de l'homme : <i>Pulex irritant</i>  Puce des rongeurs : <i>Xenopsylla cheopsis</i></p>
<b>CARACTERISTIQUES</b>	<p>Long : de 1,5 à 2,5mm. Corps latéralement plat sans ailes. Couleur brun foncé. Pattes robustes permettant de faire des bonds considérables.</p>
<b>HABITUDES, HABITAT</b>	<p>Fentes, fissures, sous tapis, nids des animaux.  Se déplace en marchant et saute pour s'accrocher et piquer l'hôte. (Toutes les puces peuvent piquer l'homme).  Mœurs diurnes.</p>
<b>DURÉE DE VIE DE L'ADULTE</b>	<p>Jusqu'à plus d'un an.</p>
<b>RÉGIME ALIMENTAIRE DE L'ADULTE</b>	<p>Sang des animaux à sang chaud.</p>
<b>FÉCONDITÉ</b>	<p>Jusqu'à un millier d'œufs.</p>
<b>DÉVELOPPEMENT LARVAIRE</b>	<p>De 1 à quelques mois.</p>
<b>RÉGIME ALIMENTAIRE DES LARVES</b>	<p>Débris organiques y compris les déjections des puces adultes ou d'autres animaux.</p>
<b>CYCLE DE DÉVELOPPEMENT</b>	<p>De 1 à quelques mois.</p>
<b>DÉGÂTS SUR MATÉRIELS</b>	<p>Tâches de sang et de déjections.</p>
<b>RISQUES SANTÉ ANIMALE ET HUMAINE</b>	<p>Irritations/démangeaisons.  Vecteur de la peste bubonique, du typhus murin, de la tularémie,...</p>