

TIQUE

(Rhipicephalus sanguineus)

DENOMINATION	Tique
CARACTERISTIQUES	Long : de 2 à 4mm (6mm après avoir absorbé une gorgée de sang). Corps ovale avec petite tête et thorax en forme de bouclier. Plat et brun clair à jeun. Globuleux et brun foncé après nourriture de sang) Pourvu de 8 pattes (6 pattes pour les jeunes du 1 ^{er} stade)
HABITUDES, HABITAT	Fréquente les dortoirs des animaux à sang chaud et les habitations « humaines ». Peut aussi se rencontrer dans la pelouse et le bois. Se laisse tomber après avoir piqué. La femelle pond au sol.
DURÉE DE VIE DE L'ADULTE	De quelques mois à plus d'1 an
RÉGIME ALIMENTAIRE DE L'ADULTE	Sang des animaux à sang chaud et sang des hommes
FÉCONDITÉ	Jusqu'à un millier d'œufs /femelle
DÉVELOPPEMENT LARVAIRE	De 3 à 5 mois
RÉGIME ALIMENTAIRE DES LARVES	Même que l'adulte
CYCLE DE DÉVELOPPEMENT	De 3 à 12 mois
DÉGÂTS SUR MATÉRIELS	Aucun
RISQUES SANTÉ ANIMALE ET HUMAINE	Vecteur de nombreux virus pathogènes, de rickettsies, de bactéries, de spirochètes et de protozoaires transmis à l'homme et à d'autres animaux. Parfois maladie de lyme chez l'homme.